



Qualité épandage :

- **Présence de blocs** : seulement 13 % du tonnage présente des blocs en moyenne sur janvier et février. Sur mars - avril les nouvelles pratiques de déstockage ont contribué à la suppression des blocs à l'épandage.
- **Poussières** : 47 % du tonnage est concerné par une siccité trop élevée sur le mois d'avril.

Etat des tonnages de cendres - avril 2017

Nomenclature	Tonnages
CET - accès alvéoles	66,04
CET - sortie auxiliaire non broyée	16,07
CET - qualité non-conforme épandage	31,42
Valorisation agricole	625,92



Données siccité avril 17

Moy.	Max.	Min.	Ecart-type
72.24	79	66	2.47

Siccité des cendres :

A partir de mars, la consigne est passée à 70%.

Sur avril on observe une tendance marquée par à 2.24 % en moyenne au dessus de la valeur seuil.

Les variations sont importantes avec un écart type de 2.47 et 13 points d'écart entre la valeur mini et maxi.

A titre d'exemple, sur la semaine 17, la moyenne est de 73.5 %.

Granulométrie :

Le suivi granulométrique montre une progression des fractions grossières 15/25mm.

Les suivis réalisés en parallèle par le laboratoire interne souligne la présence croissante de mâchefers non broyé en périphérie du tas de cendres (le suivi visuel est réalisé à heure fixe 1 / semaine).

